

Matemáticas II

Marcos Bujosa

11/04/2024

Puede encontrar la última versión de este material en

<https://github.com/mbujosab/MatematicasII/tree/main/Esp>



Marcos Bujosa. Copyright © 2008–2024

Algunos derechos reservados. Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Índice

IV Ortogonalidad	1
LECCIÓN 11: Vectores y subespacios ortogonales	2
<i>Transparencias de la Lección 11</i>	2
<i>Problemas de la Lección 11</i>	8
LECCIÓN 12: Proyecciones sobre subespacios	11
<i>Transparencias de la Lección 12</i>	11
<i>Problemas de la Lección 12</i>	14
Soluciones	17

Part IV

Ortogonalidad

LECCIÓN 11: Vectores y subespacios ortogonales

Lección 11

(Lección 11)

T-1 Esquema de la Lección 11

Esquema de la *Lección 11*

- Vectores y subespacios ortogonales
- Espacio nulo \perp espacio fila

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{C}(\mathbf{A}^T)$$

- espacio nulo por la izquierda \perp espacio columna

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^T) \perp \mathcal{C}(\mathbf{A})$$

- De las ecuaciones paramétricas a las cartesianas (o implícitas)

F1

(Lección 11)

T-2 Algunas definiciones

- Producto punto

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_{i=1}^n a_i b_i$$


- Longitud de un vector $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \|\mathbf{a}\|^2.$$

- Vector unitario: $\|\mathbf{a}\| = 1$ $\frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \cdot \mathbf{x}$

- Vectores ortogonales (perpendiculares): $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$.

F2



$$x \cdot y = 0 \iff x \perp y$$

Tma. Pitágoras:

$$x \cdot y = 0 \iff \|x\|^2 + \|y\|^2 = \|x + y\|^2$$

$$x \cdot x + y \cdot y = (x + y) \cdot (x + y).$$

F3

$$\|v\|^2 = v \cdot v$$

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \rightarrow \|x\|^2 = \quad ; \quad y = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \|y\|^2 = \quad ;$$

¿Son estos vectores ortogonales?

$$x + y = \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{pmatrix}; \quad \|x + y\|^2 = \quad ;$$

(Pitágoras)

$$x \cdot x + y \cdot y = (x + y) \cdot (x + y)$$

\iff

(Ortogonalidad)

$$x \cdot y = 0.$$

F4

Cuando el subespacio \mathcal{S} es ortogonal al subespacio \mathcal{T} :

Cada vector de \mathcal{S} es ortogonal a cada vector de \mathcal{T}

¿Son ortogonales el plano de la pizarra y el suelo?

F5

- $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \perp$ filas de \mathbf{A}

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{0} \implies \begin{pmatrix} (1|\mathbf{A}) \cdot \mathbf{x} \\ \vdots \\ (m|\mathbf{A}) \cdot \mathbf{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$


- $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \perp d\mathbf{A}$, $\forall d \in \mathbb{R}^m$ (cualquier combinación lineal de las filas)

$$\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}) \implies d\mathbf{Ax} = d \cdot \mathbf{0} = 0.$$

espacio nulo \perp espacio fila $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$

También: $\mathbf{x}\mathbf{A} = \mathbf{0} \implies \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \perp \mathcal{C}(\mathbf{A})$

F6



F7

Algoritmo que encuentra una base del complemento ortogonal

Dame varios vectores y los escribo como filas de una matriz \mathbf{M} ...

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(3)1+2] \\ [(1)1+4] \\ [(1)2+3] \\ [(1)2+4] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{L} \\ \mathbf{E} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} & \mathbf{0} \\ \mathbf{D} & \mathbf{N} \end{bmatrix}$$

Base del espacio generado por los vectores (fila): \mathcal{V}

Base del complemento ortogonal: \mathcal{V}^\perp

Pero si me das $\mathbf{N}_{|1}$ y $\mathbf{N}_{|2}$ y empiezo de nuevo... obtendré una base de...

$$\mathbf{MN} = \mathbf{0}$$

F8

Ecuaciones cartesianas (implícitas) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{Ax} = \mathbf{b}\}$:

Por ejemplo

$$\left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \text{c. sol. de } \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

Ecuaciones paramétricas:

Para el conjunto del ejemplo anterior

$$\left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^1 : \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\}$$


En este caso dimensión 1

recta

Una recta (sólo hay un parámetro a)

recta

F9




o bien

$$\left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^1 : \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\}$$

o bien

$$\left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^1 : \mathbf{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\}$$



(Lección 11) **T-10** Ecuaciones cartesianas (implícitas) y paramétricas de rectas y planos

Ecuaciones cartesianas (implícitas) $\{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b\}$:

Por ejemplo

$$\{x \in \mathbb{R}^3 \mid [1 \ -1 \ 1] x = (1,)\} = \text{c. sol. de } \{x_1 - x_2 + x_3 = 1\}$$

Ecuaciones paramétricas:


Para el conjunto del ejemplo anterior

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^3 \mid \exists p \in \mathbb{R}^2 : x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} p \right\}$$

En este caso dimensión 2
plano

Un plano (hay dos parámetros a y b)

F11




o bien

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^3 \mid \exists p \in \mathbb{R}^2 : x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} p \right\}$$

pero también

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^3 \mid \exists p \in \mathbb{R}^2 : x = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} p \right\}$$



(Lección 11)

T-11 De las ecuaciones paramétricas a las cartesianas

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}^T) \perp \mathcal{N}(\mathbf{A})$$

Considere

$$H = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^k : \mathbf{x} = \mathbf{s} + [\mathbf{n}_1; \dots; \mathbf{n}_k] \mathbf{p} \}.$$

Si encontramos \mathbf{A} tal que $\mathbf{A}\mathbf{n}_i = \mathbf{0}$ entonces si $\mathbf{x} \in H$

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{s} + \underbrace{\mathbf{A}[\mathbf{n}_1; \dots; \mathbf{n}_k]}_{\mathbf{0}} \mathbf{p} \Rightarrow \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad \text{donde } \mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{s}.$$

Por tanto

$$H = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \}.$$

F13

(Lección 11)

T-12 De la solución al sistema de ecuaciones

Ecuaciones implícitas del plano P paralelo al generado por $(1, 2, 0, -2)$ y $(0, 0, 1, 3)$ que pasa por $\mathbf{s} = (1, 3, 1, 1)$.

$$P = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \mid \exists a, b \in \mathbb{R} : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^2 : \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\}$$

Necesitamos vectores perpendiculares a $(1, 2, 0, -2)$ y a $(0, 0, 1, 3)$

F14

$$\mathbf{x} = (x, y, z, w,); \quad \mathbf{s} = (1, 3, 1, 1,).$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & -2 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 3 & & & & \\ \hline x & y & z & w & & & & \\ \hline 1 & 3 & 1 & 1 & & & & \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} [(-2)\tau_1+2] \\ [(2)\tau_1+4] \end{array}} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 3 & & & & \\ \hline x & y-2x & z & w+2x & & & & \\ \hline 1 & 1 & 1 & 3 & & & & \end{array} \right] \xrightarrow{[(-3)\tau_3+4]} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & & \\ \hline x & y-2x & z & w+2x-3z & & & & \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & & & & \end{array} \right]$$

Así $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}$; y entonces $\mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} -2x+y \\ 2x+w-3z \end{pmatrix}$ y $\mathbf{b} = \mathbf{As} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Por tanto $\begin{cases} -2x+y & = 1 \\ 2x & -3z+w=0 \end{cases}$

$$P = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -3 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

F15

Fin de la lección

Problemas de la Lección 11

(L-11) PROBLEMA 1. Describa el conjunto de vectores en \mathbb{R}^3 ortogonales a $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

(Hefferon, 2008, ejercicio 2.15 del conjunto de problemas II.2.)

(L-11) PROBLEMA 2.

(a) Encuentre una representación paramétrica de la recta que pasa por los puntos $\mathbf{x}_P = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{x}_Q = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(b) Encuentre una representación implícita de la recta anterior.

(L-11) PROBLEMA 3.

(a) Encuentre una representación paramétrica de la recta que pasa por los puntos $\mathbf{x}_P = (1, -3, 1)$ y $\mathbf{x}_Q = (-2, 4, 5)$.

(b) Encuentre una representación implícita (ecuaciones Cartesianas) de la recta.

(Lang, 1986, Example 1 in Section 1.5)

(L-11) PROBLEMA 4. ¿Hay algún vector que sea perpendicular a si mismo?

(Hefferon, 2008, ejercicio 2.17 del conjunto de problemas II.2.)

(L-11) PROBLEMA 5.

(a) Ecuación paramétrica de la recta paralela a $2x - 3y = 5$ que pasa por el punto $(1, 1)$.

(b) Encuentre una representación implícita de la recta.

(L-11) PROBLEMA 6. Calcule la longitud de cada uno de estos vectores

(a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. (b) $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. (c) $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(d) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. (e) $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

(Hefferon, 2008, ejercicio 2.11 del conjunto de problemas II.2.)

(L-11) PROBLEMA 7. Encuentre un vector unitario (de norma uno) con la misma dirección que $\mathbf{v} = (2, -1, 0, 4, -2)$.

(L-11) PROBLEMA 8. Encuentre el valor de k de manera que estos vectores sean perpendiculares.

$$(k, 1), \quad (4, 3).$$

(Hefferon, 2008, ejercicio 2.14 del conjunto de problemas II.2.)

(L-11) PROBLEMA 9. Escriba una matriz con las propiedades requeridas, o explique por qué es imposible:

(a) El espacio columna contiene $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$, el espacio nulo contiene $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

(b) El espacio fila contiene $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$, y el espacio nulo contiene $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

(c) $\mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ tiene solución, y $\mathbf{A}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

(d) Cada fila es ortogonal a cada columna (y \mathbf{A} no es la matriz cero)

(e) La suma de columnas da una columna de ceros, la suma de filas suma una fila de unos.

(Strang, 2003, ejercicio 3 del conjunto de problemas 4.1.)

(L-11) PROBLEMA 10. Si $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$, las columnas de \mathbf{B} pertenecen a _____ de \mathbf{A} . Las filas de \mathbf{A} están contenidas en el _____ de \mathbf{B} . Por qué no es posible que \mathbf{A} y \mathbf{B} sean matrices 3 por 3 de rango 2?

(Strang, 2003, ejercicio 4 del conjunto de problemas 4.1.)

(L-11) PROBLEMA 11. Suponga que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ y que $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. ¿Debe ocurrir que $\mathbf{v} = \mathbf{w}$?

(Hefferon, 2008, ejercicio 2.20 del conjunto de problemas II.2.)

(L-11) PROBLEMA 12.

(a) Si $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ tiene solución y $\mathbf{A}^T \mathbf{y} = \mathbf{0}$, entonces \mathbf{y} es perpendicular a _____.

(b) Si $\mathbf{A}^T \mathbf{y} = \mathbf{c}$ tiene solución y $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, entonces \mathbf{x} es perpendicular a _____.

(Strang, 2003, ejercicio 5 del conjunto de problemas 4.1.)

(L-11) PROBLEMA 13. Demuestre, para \mathbb{R}^n , que si \mathbf{u} y \mathbf{v} son perpendiculares, entonces $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$.

(Hefferon, 2008, ejercicio 2.33 del conjunto de problemas II.2.)

(L-11) PROBLEMA 14.

(a) Encuentre las ecuaciones paramétricas del plano que pasa por el punto $(0, 1, 1)$ y tiene por vectores directores $(0, 1, 2)$ y $(1, 1, 0)$

(b) Escriba la ecuación implícita del mismo plano.

(L-11) PROBLEMA 15.

(a) Encuentre las ecuaciones paramétricas del plano que pasa por el punto $(2, 1, 3)$ y es perpendicular a $(3, 1, 1)$.

(b) Escriba la ecuación implícita del mismo plano.

(L-11) PROBLEMA 16. Encuentre una matriz de 1 por 3 cuyo espacio nulo conste de todos los vectores de \mathbb{R}^3 tales que $x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0$. Encuentre una matriz de 3 por 3 con el mismo espacio nulo.

(Strang, 2007, ejercicio 9 del conjunto de problemas 2.4.)

(L-11) PROBLEMA 17. Considere el sistema de ecuaciones $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

(a) (1pts) Obtenga la solución al sistema.

(b) (0.5pts) Explique por qué el conjunto de vectores solución al sistema anterior es una recta en \mathbb{R}^5 . Indique un vector director y un punto por el que pasa la recta.

(c) (1pts) Encuentre los vectores perpendiculares al vector director anterior. Pruebe que el conjunto de vectores perpendiculares a dicho vector forman un subespacio vectorial de dimensión 4. Encuentre una base de dicho subespacio.

(L-11) PROBLEMA 18. Consider \mathbf{A} with exactly two special solutions for $\mathbf{x}\mathbf{A} = \mathbf{0}$:

$$\mathbf{s}_1 = (3, 1, 0, 0), \quad \text{and} \quad \mathbf{s}_2 = (6, 0, 2, 1).$$

(a) Find the reduced row echelon form \mathbf{R} of \mathbf{A} .

(b) What is the row space of \mathbf{A} ?

(c) What is the complete solution to $\mathbf{x}\mathbf{R} = (3, 6)$?

(d) Find a combination of rows 2, 3, 4 that equals $\mathbf{0}$. (Not OK to use $0(\mathbf{2}|\mathbf{A}) + 0(\mathbf{3}|\mathbf{A}) + 0(\mathbf{4}|\mathbf{A})$. The problem is to show that these rows are dependent.)

basado en MIT Course 18.06 Quiz 1, March 4, 2013

Fin de los Problemas de la Lección 11

LECCIÓN 12: Proyecciones sobre subespacios

Lección 12

(Lección 12)

T-1 Esquema de la Lección 12

Esquema de la Lección 12

- Proyecciones
- Matrices proyección

F16

(Lección 12)

T-2 Suma directa de subespacios

\mathbb{R}^n es suma directa de \mathcal{A} y \mathcal{B} ($\mathbb{R}^n = \mathcal{A} \oplus \mathcal{B}$)

si todo $x \in \mathbb{R}^n$ tiene una descomposición única $x = a + b$,

con $a \in \mathcal{A}$ y $b \in \mathcal{B}$.

Ejemplo 1.

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A})$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 10 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Base de } \mathbb{R}^3; \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

$$\forall x \in \mathbb{R}^3, \exists c_1, c_2, c_3 \mid x = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = a + b$$


donde $a \in \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$ y $b \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$.

También $\mathbb{R}^m = \mathcal{C}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$

F17

(Lección 12)

T-3 El gran esquema: suma directa de complementos ortogonales




F18

(Lección 12) T-4 Proyección ortogonal sobre $\mathcal{C}(\mathbf{A})$

Sea \mathbf{A} ; como $\mathbb{R}^m = \mathcal{C}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$, para todo $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$

$$\mathbf{y} = \hat{\mathbf{y}} + \mathbf{e}; \quad (\mathbf{e} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}})$$

con $\hat{\mathbf{y}} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$ y $\mathbf{e} \perp \hat{\mathbf{y}}$, así que $\mathbf{e} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$.



¿Cómo calcular $\hat{\mathbf{y}} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$?

F19

(Lección 12) T-5 Ecuaciones normales

Sea \mathbf{A} . Buscamos la descomposición $\mathbf{y} = \hat{\mathbf{y}} + \mathbf{e}$ donde

$$\hat{\mathbf{y}} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}) \quad \text{y} \quad (\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y}) \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$$

Por tanto

$$\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{y}} \quad \Leftrightarrow \quad (\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y}) \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$$

Es decir

$$\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{y}} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{A}^\top(\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y}) = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad (\mathbf{A}^\top\mathbf{A})\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^\top\mathbf{y}$$

¡Sistemas equivalentes! $\Rightarrow \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top\mathbf{A}) \Rightarrow \text{rg}(\mathbf{A}) = \text{rg}(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})$

solución única $\hat{\mathbf{x}}$ si y sólo si \mathbf{A} tiene columnas independientes

F20

(Lección 12) T-6 Solución a las ecuaciones normales (rango completo por columnas)

$$\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^\top\mathbf{y} \quad (\mathbf{A} \text{ de rango completo por columnas})$$

La solución

La proyección

La matriz de proyección

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}} &= (\mathbf{A}^\top\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top\mathbf{y} \\ \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top\mathbf{y} \\ \mathbf{P} &= \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top \end{aligned}$$


$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{P}\mathbf{y}$$

\mathbf{P} : Simétrica e idempotente.

F21

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T$$


La proyección Py es el punto \hat{y} de $C(A)$ más próximo a y



Casos extremos:

- Si $y \in C(A)$ entonces $Py = y$
- Si $y \perp C(A)$ entonces $Py = 0$

F22



Queremos encontrar el punto \hat{y} sobre la línea más próximo a y

$$\hat{y} \in C([a]) \perp e = (y - \hat{y}) \in \mathcal{N}([a]^T).$$

\hat{y} es algún múltiplo de a :

Cómo:

La solución

La proyección

La matriz de proyección

$$\hat{y} = [a](\hat{x})$$

$$[a]^T [a] \hat{x} = [a]^T y$$

$$\hat{x} = ([a]^T [a])^{-1} [a]^T y$$

$$\hat{y} = [a] \hat{x} = [a] ([a]^T [a])^{-1} [a]^T y$$


$$P = [a] ([a]^T [a])^{-1} [a]^T$$

F23

¿Por qué proyectar?

Así que resolveremos


$$Ax = (\text{Proy. de } y \text{ sobre } C(A)).$$



$$(y - \hat{y}) = e \perp C(A) \quad \dots \text{ese es el hecho fundamental.}$$

F24

¿Qué es la proyección de \mathbf{y} sobre el espacio columna de $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} | & | \\ \mathbf{A}_{|1} & \mathbf{A}_{|2} \\ | & | \end{bmatrix}$?




“Encontrar una combinación de columnas tal que $\mathbf{e} \perp \mathcal{C}(\mathbf{A})$ ”

$$\mathbf{e} \perp \mathcal{C}(\mathbf{A}) \Rightarrow \mathbf{e} \in$$

$$\mathbf{A}^T \mathbf{e} = \mathbf{A}^T (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}) = \mathbf{A}^T (\mathbf{y} - \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{0} \Leftrightarrow \boxed{(\mathbf{A}^T \mathbf{A})\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^T \mathbf{y}}$$

F25

\mathbf{y} tiene un componente $\hat{\mathbf{y}}$ en $\mathcal{C}(\mathbf{A})$, y otro \mathbf{e} en $\mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp$.



$$\hat{\mathbf{y}} + \mathbf{e} = \mathbf{y}$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{P}\mathbf{y}$$

$$\mathbf{e} = (\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{y}$$

es la proyección sobre $\mathcal{C}(\mathbf{A})$

es la proyección sobre $\mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp$

F26

Fin de la lección

Problemas de la Lección 12

(L-12) PROBLEMA 1. Projete el primer vector (\mathbf{b}) sobre la recta generada por el segundo vector (\mathbf{a}). Compruebe que \mathbf{e} es perpendicular a \mathbf{a} . Encuentre la matriz proyección $\mathbf{P} = [\mathbf{a}]([\mathbf{a}]^T[\mathbf{a}])^{-1}[\mathbf{a}]^T$ sobre la recta generada por cada vector \mathbf{a} . Verifique en cada caso que $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$. Multiplique $\mathbf{P}\mathbf{b}$ en cada caso para calcular la proyección $\hat{\mathbf{b}}$.

(a) $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$; $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

(b) $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$; $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$.

(c) $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$; $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

(d) $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$; $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 12 \end{pmatrix}$.

(Hefferon, 2008, ejercicio 1.6 del conjunto de problemas VI.1.)

(L-12) PROBLEMA 2. Projete ortogonalmente el vector sobre la recta.

- (a) $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$, La recta: $\left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^1, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\}$.
- (b) $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, la recta descrita por la ecuación $y = 3x$.

(L-12) PROBLEMA 3. Aunque los dibujos nos han guiado el desarrollo del tema, no estamos restringidos a espacios que podamos dibujar. En \mathbb{R}^4 projete el vector sobre la recta.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}; \left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^4 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^1, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\}.$$

(L-12) PROBLEMA 4.

- (a) Projete el vector $\mathbf{b} = (1, 1)$ sobre las rectas generadas por $\mathbf{a}_1 = (1, 0)$ y $\mathbf{a}_2 = (1, 2)$. Sume las proyecciones: $\hat{\mathbf{b}}_1 + \hat{\mathbf{b}}_2$. Las proyecciones no suman \mathbf{b} porque los vectores \mathbf{a}_1 y \mathbf{a}_2 no son ortogonales.
- (b) La proyección de \mathbf{b} sobre el plano generado por \mathbf{a}_1 y \mathbf{a}_2 será igual a \mathbf{b} . Encuentre $\mathbf{P} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T$ para $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1; \mathbf{a}_2]$.

(Strang, 2003, ejercicio 8–9 del conjunto de problemas 4.2.)

(L-12) PROBLEMA 5.

- (a) Si $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$ demuestre que $(\mathbf{I} - \mathbf{P})^2 = \mathbf{I} - \mathbf{P}$. Cuando \mathbf{P} proyecta sobre el espacio columna de \mathbf{A} , $(\mathbf{I} - \mathbf{P})$ proyecta sobre el _____.
- (b) Si $\mathbf{P}^T = \mathbf{P}$ demuestre que $(\mathbf{I} - \mathbf{P})^T = \mathbf{I} - \mathbf{P}$.

(Strang, 2003, ejercicio 17 del conjunto de problemas 4.2.)

(L-12) PROBLEMA 6.

- (a) Calcule las matrices proyección $\mathbf{P} = [\mathbf{a}][(\mathbf{a}^T[\mathbf{a}])^{-1}[\mathbf{a}]^T$ sobre las rectas que pasan por $\mathbf{a}_1 = (-1, 2, 2)$ y $\mathbf{a}_2 = (2, 2, -1)$. Compruebe que $\mathbf{a}_1 \perp \mathbf{a}_2$. Multiplique esas matrices proyección y explique por qué su producto $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2$ es lo que es.
- (b) Projete $\mathbf{b} = (1, 0, 0)$ sobre las rectas generadas por \mathbf{a}_1 , y \mathbf{a}_2 y también por $\mathbf{a}_3 = (2, -1, 2)$. Sume las tres proyecciones $\hat{\mathbf{b}}_1 + \hat{\mathbf{b}}_2 + \hat{\mathbf{b}}_3$.
- (c) Encuentre la matriz proyección \mathbf{P}_3 sobre $\mathcal{L}([\mathbf{a}_3;]) = \mathcal{L}([(2, -1, 2);])$. Verifique que $\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2 + \mathbf{P}_3 = \mathbf{I}$. ¡La base $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ es ortogonal!

(Strang, 2003, ejercicio 5–7 del conjunto de problemas 4.2.)

(L-12) PROBLEMA 7. Projete \mathbf{b} sobre el espacio columna de \mathbf{A} resolviendo $\mathbf{A}^T\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^T\mathbf{b}$ y después calculando $\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}$. Encuentre $\mathbf{e} = \mathbf{b} - \hat{\mathbf{b}}$.

- (a) $\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$
- (b) $\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$

- (c) Calcule las matrices proyección \mathbf{P}_1 y \mathbf{P}_2 sobre los espacios columna. Verifique que $\mathbf{P}_1\mathbf{b}_1$ da la primera proyección $\hat{\mathbf{b}}_1$. Verifique también que $(\mathbf{P}_2)^2 = \mathbf{P}_2$.

(Strang, 2003, ejercicio 11–12 del conjunto de problemas 4.2.)

Fin de los Problemas de la Lección 12

References

Hefferon, J. (2008). *Linear Algebra*. Jim Hefferon, Colchester, Vermont USA. This text is Free.

URL <ftp://joshua.smcvt.edu/pub/hefferon/book/book.pdf>

Lang, S. (1986). *Introduction to Linear Algebra*. Springer-Verlag, second ed.

Strang, G. (2003). *Introduction to Linear Algebra*. Wellesley-Cambridge Press, Wellesley, Massachusetts. USA, third ed. ISBN 0-9614088-9-8.

Strang, G. (2007). *Álgebra Lineal y sus Aplicaciones*. Thomsom Learning, Inc, Santa Fe, México, D. F., fourth ed. ISBN 970686609-4.

Soluciones

(L-11) **Problema 1.** Puesto que $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) \perp \mathcal{N}(\mathbf{A})$, tan sólo necesitamos encontrar el complemento ortogonal del espacio generado por $(1, 3, -1)$, o lo que es lo mismo, el espacio nulo de $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} [(-3)\mathbf{1}+2] \\ [(1)\mathbf{1}+3] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{L} \\ \mathbf{E} \end{bmatrix}$$

Por tanto, el conjunto de vectores en \mathbb{R}^3 ortogonales a $(1, 3, -1)$ es

$$\left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^2 \text{ tal que } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\}.$$

Con NAcAL hay varias formas de obtener dicho subespacio. Hay dos formas de invocar `SubEspacio`; si el argumento es un `Sistema` de Vectores de \mathbb{R}^n , nos devuelve el `SubEspacio` generado por dicho sistema.

```
a = Vector([-3,1,0])
b = Vector([1,0,1])
SubEspacio(Sistema([a,b]))
```

Si el argumento es una `Matrix`, nos devuelve el espacio nulo de dicha matriz

```
v = Vector([1,3,-1])
A = ~Matrix([v]) # trasponemos para obtener la matriz fila
SubEspacio(A)
```

Pero como nos piden el complemento ortogonal del subespacio generado por el vector, sencillamente podemos escribir (pues en este contexto `~` significa el complemento ortogonal):

```
~SubEspacio(Sistema([v]))
```

La representación mediante ecuaciones paramétricas o cartesianas no es única, de hecho, obtenemos unas ecuaciones paramétricas diferentes para los sistemas $[\mathbf{a}; \mathbf{b};]$ (visto más arriba) y $[\mathbf{b}; \mathbf{a};]$

```
SubEspacio(Sistema([b,a]))
```

Por tanto, es útil poder comprobar si dos subespacios son iguales

```
~SubEspacio(Sistema([v])) == SubEspacio(Sistema([b,a]))
```

□

(L-11) **Problema 2(a)** Encontramos primero un vector paralelo a la recta:

$$\mathbf{v} = \mathbf{x}_P - \mathbf{x}_Q = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Así que una representación paramétrica es

$$\left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^1, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\}.$$

Con NAcAL, los puntos, rectas, planos, etc. (es decir, regiones planas en \mathbb{R}^n) se crean con `EAFin`. Los argumentos necesarios para `EAFin` son un `SubEspacio` y un `Vector`. Si en lugar de un `SubEspacio` se da un `Sistema` de Vectores de \mathbb{R}^n o una `Matrix`, NAcAL usará dichos argumentos para generar el subespacio necesario (el subespacio generado por el sistema en el primer caso, o el espacio nulo de la matriz en el segundo).

Así, en este caso obtenemos las ecuaciones de la recta requerida con:

```
p = Vector([1,2])
q = Vector([3,1])
S = SubEspacio(Sistema([p-q]))
R = EAFin(S,p)
Math( R.EcParametricas() ) # Por ahora solo quiero visualizar las Ec. Paramétricas de R
```

□

(L-11) Problema 2(b) Buscamos multiplicar $\mathbf{x} = \mathbf{x}_P + a\mathbf{v}$ por un vector perpendicular a \mathbf{v} . Lo haremos mediante la eliminación gaussiana:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ x & y \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(2)2] \\ [(1)1+2] \end{matrix}} \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ x & x+2y \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{el conjunto de soluciones de } \{x+2y=5\};$$

y por tanto la recta es:

$$\{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 \mid [1 \ 2] \mathbf{v} = (5)\}.$$

Vamos a reproducir el cálculo de lapiz y papel con NAcAL.

```
x,y = sympy.symbols('x y')
N = Matrix([p-q])
M = N.apila(Matrix([Vector([x,y]]),1).apila(Matrix([p]),1)
Math( rprElim(M, Elim(N).pasos) )
```

Por tanto la recta es el conjunto de vectores que resuelven el siguiente Sistema de Ecuaciones Lineales:

```
A = Matrix([[1,2]])
b = Vector([5])
SEL(A,b).eafin
```

(fíjese que NAcAL guarda como un atributo (de tipo EAfin) el conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones)

□

(L-11) Problema 3(a) Encontramos primero un vector en la misma dirección que la recta

$$\mathbf{v} = \mathbf{x}_P - \mathbf{x}_Q = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = (3, -7, -4).$$

Así que una representación paramétrica es

$$\left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^1, \mathbf{v} = (1, -3, 1) + \begin{bmatrix} 3 \\ -7 \\ -4 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\}.$$

□

(L-11) Problema 3(b)

$$\begin{bmatrix} 3 & -7 & -4 \\ x & y & z \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(3)2] \\ [(7)1+2] \\ [(3)3] \\ [(4)1+3] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ x & 7x+3y & 4x+3z \\ 1 & -2 & 7 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 7x+3y & = -2 \\ 4x & + 3z = 7 \end{cases};$$

Por tanto las ecuaciones cartesianas de la recta son:

$$\left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{bmatrix} 7 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix} \right\}.$$

Este sistema cuenta con dos ecuaciones. Si las tomamos por separado corresponden a dos planos en \mathbb{R}^3 .

```
p1=SEL(Matrix([[7,3,0]]),Vector([-2])).eafin
p1
```

y

```
p1=SEL(Matrix([[7,3,0]]),Vector([-2])).eafin
p1
```

(sabemos que son dos planos, pues las ecuaciones paramétricas tienen dos parámetros, y las matrices de coeficientes de las ecuaciones cartesianas tiene dos columnas libres) La recta del ejercicio corresponde a la intersección de ambos planos, es decir, a los puntos que pertenecen a ambos planos:

(L-11) Problema 4. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \sum_{i=1}^n a_i^2 = 0 \iff \mathbf{a} = \mathbf{0}$. Por tanto, la respuesta es si, el vector $\mathbf{0}$.

(L-11) Problema 5(a) Puesto que es paralela a la recta $2x - 3y = 5$, el vector director es común, es decir, necesitamos encontrar un vector \mathbf{v} del espacio nulo de la matriz de coeficientes del sistema; por ejemplo:

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(6)1] \\ [(2)2] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 6 & -6 \\ 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(1)2+1]} \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 3 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

por tanto $\left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \exists a \in \mathbb{R} \text{ tal que } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$

(L-11) Problema 5(b) Basta sustituir (x, y) por el punto requerido $(1, 1)$ para obtener el “vector” del lado derecho \mathbf{b} .

$$2x - 3y = 2 \cdot 1 - 3 \cdot 1 = -1 \Rightarrow 2x - 3y = -1.$$

Por tanto

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid [2 \quad -3] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (-1) \right\}$$

(L-11) Problema 6(a) $\sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$

(L-11) Problema 6(b) $\sqrt{5}$

(L-11) Problema 6(c) $\sqrt{18}$

(L-11) Problema 6(d) 0

(L-11) Problema 6(e) $\sqrt{3}$

(L-11) Problema 7. $\|\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 4 + 1 + 0 + 16 + 4 = 25$ así que tomamos $\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \cdot \mathbf{v} = \left(\frac{2}{5}, \frac{-1}{5}, 0, \frac{4}{5}, \frac{-2}{5}\right)$.

(L-11) Problema 8. Su producto punto debe ser cero, por tanto $(k)(4) + (1)(3) = 0$ por tanto $k = -3/4$.

(L-11) Problema 9(a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & a \\ 2 & -3 & b \\ -3 & 5 & c \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix};$

Así pues, $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \\ -3 & 5 & -2 \end{bmatrix}$.

(L-11) Problema 9(b) Imposible, $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ no es ortogonal a $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

(L-11) Problema 9(c) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ pertenece a $\mathcal{C}(\mathbf{A})$, y $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ pertenece a $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. Es imposible: estos vectores no son perpendiculares.

(L-11) Problema 9(d) Se pide que $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{0}$. Por ejemplo $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, o $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

(L-11) Problema 9(e) $(1, 1, 1)$ debe pertenecer simultáneamente al espacio nulo, $\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$; y al espacio fila, $(1, 1, 1) \mathbf{A} = (1, 1, 1)$, ... no existe tal matriz.

(L-11) Problema 10. Si $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$, las columnas \mathbf{B} están contenidas en el *espacio nulo* de \mathbf{A} . Las filas de \mathbf{A} están en el *espacio nulo por la izquierda* de \mathbf{B} .

Si rango=2, los espacios fila y columna de \mathbf{A} y \mathbf{B} tienen dimensión 2 (\mathbf{A} tiene dos filas linealmente independientes y \mathbf{B} tiene dos columnas linealmente independientes). Pero entonces $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ y $\mathcal{N}(\mathbf{B}^T)$ tienen dimensión 1 (una sola columna libre para \mathbf{A} y una sola fila libre para \mathbf{B}).

Esto nos lleva a una contradicción: no es posible que dos filas linealmente independientes pertenezcan a $\mathcal{N}(\mathbf{B}^T)$ que tiene dimensión 1. Del mismo modo, no es posible que dos columnas linealmente independientes pertenezcan a $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ que tiene dimensión 1.

Para que esto fuera posible los cuatro subespacios deberían tener dimensión 2 (dos vectores linealmente independientes en cada espacio), pero esto es imposible para una matriz de orden 3 por 3.

(L-11) Problema 11. No. Por ejemplo:

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$, pero $\mathbf{v} \neq \mathbf{w}$.

(L-11) Problema 12(a) Por una parte $\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$ por otra parte $\mathbf{A}^T \mathbf{y} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{y} \perp \mathcal{C}(\mathbf{A})$.

Si $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ tiene solución y $\mathbf{A}^T \mathbf{y} = \mathbf{0}$, entonces \mathbf{y} es perpendicular a \mathbf{b} .

$$\mathbf{y} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{y} \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0} \cdot \mathbf{b} = 0.$$

(L-11) Problema 12(b) Si $\mathbf{A}^T \mathbf{y} = \mathbf{c}$ entonces $\mathbf{y} \mathbf{A} = \mathbf{c}$, además $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$; entonces \mathbf{x} es perpendicular a \mathbf{c} .

\mathbf{c} pertenece al espacio fila, y por tanto es perpendicular a \mathbf{x} que pertenece al espacio nulo. Otra forma de verlo:

$$\mathbf{c} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{y} \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{0} = 0.$$

(L-11) Problema 13. Si \mathbf{u} y \mathbf{v} son perpendiculares, entonces

$$\|(\mathbf{u} + \mathbf{v})\|^2 = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$$

(la tercera igualdad es cierta debido a que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$).

(L-11) Problema 14(a) $\left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^2, \mathbf{v} = (0, 1, 1) + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\}$.

(L-11) Problema 14(b)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ x & y & z \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(-1)\mathbf{1}+\mathbf{2}]} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ x & -x+y & z \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(-2)\mathbf{2}+\mathbf{3}]} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ x & -x+y & 2x-2y+z \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Por tanto: $\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid [2 \quad -2 \quad 1] \mathbf{v} = (-1,) \}$.

```

p = Vector([0,1,1])
v = Vector([0,1,2])
w = Vector([1,1,0])
S = SubEspacio(Sistema([v,w]))
EAfin(S,p)

```

□

(L-11) Problema 15(a) Puesto que nos piden un plano en \mathbb{R}^3 , en este caso necesitamos encontrar dos vectores ortogonales a $(3, 1, 1)$. Por ejemplo, $(-1, 3, 0)$ y $(0, -1, 1)$. Por tanto,

$$\left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^2 \text{ tal que } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\}.$$

□

(L-11) Problema 15(b) En este caso ya conocemos, por el enunciado, un vector ortogonal a la parte paramétrica; así pues:

$$\begin{aligned}
[3 \ 1 \ 1] \mathbf{x} = [3 \ 1 \ 1] \mathbf{s}; & \Rightarrow [3 \ 1 \ 1] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = [3 \ 1 \ 1] \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = (10,); \\
& \Rightarrow \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid [3 \ 1 \ 1] \mathbf{x} = (10,) \right\}.
\end{aligned}$$

```

p = Vector([2,1,3])
v = Vector([3,1,1])
S = SubEspacio(Matrix([v])) # esta es una alternativa
#S = ~SubEspacio(Sistema([v])) # esta es otra alternativa
EAfin(S,p)

```

□

(L-11) Problema 16. Podemos tomar como fila de la matriz \mathbf{A} una combinación lineal de una base del espacio nulo por la izquierda de la matriz $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$. Así pues,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} [(-2)1+2] \\ [(-4)1+3] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y entonces

$$\mathbf{A}_{1 \times 3} = [1 \ 1] \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [-6 \ 1 \ 1]$$

cumple el requisito. Una matriz 3 por 3 con el mismo espacio nulo es, por ejemplo

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

□

(L-11) Problema 17(a) La solución completa es:

$$\mathbf{b} = \left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^5 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^1, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\}$$

```

A = Matrix([ [1,2,0,1,1], [0,0,2,3,1], [0,0,1,4,2], [0,0,0,1,1] ])
b = Vector([1,0,1,2])
SEL (A, b, 1)

```

□

(L-11) Problema 17(b) Puesto que la matriz de coeficientes tiene cinco columnas, el sistema tiene cinco incógnitas, así pues, los vectores que pertenecen al conjunto de soluciones tienen cinco componentes (un número por columna). Así pues, el conjunto de soluciones es un subconjunto de \mathbb{R}^5 ; Y en este caso, dicho conjunto es una recta, ya que la dimensión de $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ es uno. Así pues, un vector director es cualquier múltiplo (excepto el vector nulo $\mathbf{0}$) de la solución especial que hemos encontrado: $\mathbf{n} = (-2, 1, 0, 0, 0)$. Y uno de los puntos por donde pasa la recta es la solución particular que obtuvimos al resolver el sistema: $\mathbf{s} = (-1, 0, 1, -2, 4)$.

□

(L-11) Problema 17(c)

$$\begin{bmatrix} [\mathbf{n}]^\top \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(2)2] \\ [(1)1+2] \end{matrix}} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{L} \\ \mathbf{E} \end{bmatrix}$$

Las cuatro últimas columnas de la matriz \mathbf{E} son vectores perpendiculares a \mathbf{n} ; y es evidente que son cuatro, y que son linealmente independientes, así que son una base del subespacio perpendicular a \mathbf{n} .

□

(L-11) Problema 18(a) Any column of \mathbf{A} is orthogonal to the two special solutions given in the problem. That is,

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \tau \\ [(-3)2+1] \\ [(-6)4+1] \\ [(-2)4+3] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -6 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{so} \quad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 0 \\ 0 & 1 \\ -6 & -2 \end{bmatrix}.$$

□

(L-11) Problema 18(b) \mathbf{R} has two pivots, and therefore \mathbf{A} has two pivots and $r(\mathbf{A}) = 2$. Two independent rows in \mathbb{R}^2 span \mathbb{R}^2 , so $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) = \mathbb{R}^2$.

□

(L-11) Problema 18(c) Since rows 1 and 3 are pivot rows, then $\mathbf{x}_p = (3, 0, 6, 0)$ is a particular solution, so the complete solution is

$$\left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^4 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^2, \mathbf{v} = (3, 0, 6, 0) + \mathbf{p} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

since

$$(3, 0, 6, 0) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 0 \\ 0 & 1 \\ -6 & -2 \end{bmatrix} = (3, 6)$$

and

$$\mathbf{p} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 0 \\ 0 & 1 \\ -6 & -2 \end{bmatrix} = \mathbf{p} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = (0, 0).$$

□

(L-11) Problema 18(d) It is easy to see that

$$-2 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

If you dont see that, we can always use gaussian elimination

$$\begin{bmatrix} -3 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(-2)\mathbf{1}+\mathbf{3}]} \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[(2)\mathbf{2}+\mathbf{3}]} \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

□

(L-12) Problema 1(a)

$$\hat{\mathbf{b}} = [\mathbf{a}]([\mathbf{a}]^T[\mathbf{a}])^{-1}[\mathbf{a}]^T\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 24 \\ 16 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{e} = \mathbf{b} - \hat{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 24 \\ 16 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e} = (3, 2) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} \frac{1}{13} = 0 \frac{1}{13} = 0.$$

$$\mathbf{P} = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{P}^2 = \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 117 & 78 \\ 78 & 52 \end{bmatrix} = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} = \mathbf{P};$$

$$\mathbf{P}\mathbf{b} = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 24 \\ 16 \end{pmatrix}.$$

```

a      = Vector([3,2]);  b = Vector([2,1]);  A = Matrix([a])
P      = A*InvMat((~A)*A)*(~A)
bhat  = P*b;   e = b-bhat
Sistema([bhat,e,P])

```

□

(L-12) Problema 1(b)

$$\hat{\mathbf{b}} = [\mathbf{a}]([\mathbf{a}]^T[\mathbf{a}])^{-1}[\mathbf{a}]^T\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 18 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{e} = \mathbf{b} - \hat{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 18 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e} = (3, 0) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \end{pmatrix} \frac{1}{9} = 0 \frac{1}{9} = 0.$$

$$\mathbf{P} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{P}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{P};$$

$$\mathbf{P}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

□

(L-12) Problema 1(c)

$$\hat{\mathbf{b}} = [\mathbf{a}]([\mathbf{a}]^T[\mathbf{a}])^{-1}[\mathbf{a}]^T\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} =$$

$$\frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{e} = \mathbf{b} - \hat{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} - \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 23 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e} = (1, 2, -1) \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 23 \end{pmatrix} \frac{1}{6} = 0 \frac{1}{6} = 0.$$

$$\mathbf{P} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{P}^2 = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 6 & 12 & -6 \\ 12 & 24 & -12 \\ -6 & -12 & 6 \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{P}\mathbf{b} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

□

(L-12) Problema 1(d)

$$\hat{\mathbf{b}} = [\mathbf{a}]([\mathbf{a}]^\top[\mathbf{a}])^{-1}[\mathbf{a}]^\top\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 12 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 3 & 3 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 12 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 12 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} =$$

$$\frac{1}{162} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 12 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{e} = \mathbf{b} - \hat{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{0} = 0.$$

$$\mathbf{P} = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 4 \\ 4 & 4 & 16 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{P}^2 = \frac{1}{18} \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 18 & 18 & 72 \\ 18 & 18 & 72 \\ 72 & 72 & 288 \end{bmatrix} = \mathbf{P};$$

$$\mathbf{P}\mathbf{b} = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 4 \\ 4 & 4 & 16 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

□

(L-12) Problema 2(a)

$$\hat{\mathbf{b}} = [\mathbf{a}]([\mathbf{a}]^\top[\mathbf{a}])^{-1}[\mathbf{a}]^\top\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} -3 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} -3 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} =$$

$$\frac{1}{19} \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{19} \begin{bmatrix} 9 & -3 & 9 \\ -3 & 1 & -3 \\ 9 & -3 & 9 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

```

b      = Vector([2,-1,4]); a = Vector([-3,1,-3]); A = Matrix([a])
P      = A*InvMat((~A)*A)*(~A)      # Matriz proyección
bhat1  = P*b                        # Alternativa 1
x      = SEL((~A)*A, (~A)*b).solP   # Solución Ecuaciones Normales
bhat2  = A*x                        # Alternativa 2
Sistema([bhat1,bhat2])

```

□

(L-12) Problema 2(b) La recta es el conjunto de soluciones a $3x - y = 0$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} [(3)2] \\ [(1)1+2] \end{matrix}} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{L} \\ \mathbf{E} \end{bmatrix};$$

así que debemos proyectar sobre la recta

$$\text{La recta : } \left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^1, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\}$$

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{b}} &= [\mathbf{a}]([\mathbf{a}]^\top[\mathbf{a}])^{-1}[\mathbf{a}]^\top\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \end{pmatrix}; \end{aligned}$$

```

b = Vector([-1,-1])
B = Matrix([[3,-1]])

a = Homogenea(B).sgen|1
# a = Homogenea(B).enulo.sgen|1 # alternativa equivalente
# a = EAfin(B, V0(2)).S.sgen|1 # alternativa equivalente

A = Matrix([a])
P = A*InvMat((~A)*A)*(~A) # Matriz proyección
bhat1 = P*b # Alternativa 1
x = SEL( (~A)*A, (~A)*b ).solP # Solución Ecuaciones Normales
bhat2 = A*x # Alternativa 2
Sistema([bhat1, bhat2])

```


□

(L-12) Problema 3.

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{b}} &= [\mathbf{a}]([\mathbf{a}]^\top[\mathbf{a}])^{-1}[\mathbf{a}]^\top\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}; \end{aligned}$$

□

(L-12) Problema 4(a) $\hat{\mathbf{b}}_1 = (1, 0)$ y $\hat{\mathbf{b}}_2 = (\frac{3}{5}, \frac{6}{5})$. Entonces $\hat{\mathbf{b}}_1 + \hat{\mathbf{b}}_2 \neq \mathbf{b}$.



```

b = Vector([1,1])
a1 = Vector([1,0])
a2 = Vector([1,2])

A1 = Matrix([a1])
bhat1 = A1 * SEL((~A1)*A1, (~A1*b)).solP

A2 = Matrix([a2])
bhat2 = A2 * SEL((~A2)*A2, (~A2*b)).solP
Sistema([bhat1, bhat2])

```

□

(L-12) Problema 4(b) Puesto que \mathbf{A} es invertible, la matriz proyección $\mathbf{P} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top = \mathbf{I}$ proyecta sobre todo el espacio \mathbb{R}^2 . Por tanto $\hat{\mathbf{b}}_1 = \mathbf{P}\mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_1$.

```

A3 = Matrix([a1,a2])
P = A3*InvMat((~A3)*A3)*(~A3)
bhat3 = P*b
Sistema([bhat1,bhat2,bhat3,P])

```

□

(L-12) Problema 5(a) $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$ y por tanto $(\mathbf{I} - \mathbf{P})^2 = (\mathbf{I} - \mathbf{P})(\mathbf{I} - \mathbf{P}) = \mathbf{I} - \mathbf{P}\mathbf{I} - \mathbf{I}\mathbf{P} + \mathbf{P}^2 = \mathbf{I} - \mathbf{P}$.

Cuando \mathbf{P} proyecta sobre el espacio columna de \mathbf{A} , $(\mathbf{I} - \mathbf{P})$ proyecta sobre el *espacio nulo por la izquierda* de \mathbf{A} .

□

(L-12) Problema 5(b) $\mathbf{P}^\top = \mathbf{P}$ y por tanto $(\mathbf{I} - \mathbf{P})^\top = (\mathbf{I}^\top - \mathbf{P}^\top) = \mathbf{I} - \mathbf{P}$.

□

(L-12) Problema 6(a)

$$\mathbf{P}_1 = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & 4 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{P}_2 = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 4 & 4 & -2 \\ 4 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

$\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 =$ matriz cero debido a que $\mathbf{a}_1 \perp \mathbf{a}_2$.

□

(L-12) Problema 6(b) $\hat{\mathbf{b}}_1 = \frac{1}{9}(1, -2, -2)$, $\hat{\mathbf{b}}_2 = \frac{1}{9}(4, 4, -2)$, $\hat{\mathbf{b}}_3 = \frac{1}{9}(4, -2, 4)$. Entonces $\hat{\mathbf{b}}_1 + \hat{\mathbf{b}}_2 + \hat{\mathbf{b}}_3 = (1, 0, 0) = \mathbf{b}$. Nótese que $\mathbf{a}_3 \perp \mathbf{a}_1$ y $\mathbf{a}_3 \perp \mathbf{a}_2$.

□

(L-12) Problema 6(c)

$$\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2 + \mathbf{P}_3 = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & 4 \end{bmatrix} + \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 4 & 4 & -2 \\ 4 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 4 & -2 & 4 \\ -2 & 1 & -2 \\ 4 & -2 & 4 \end{bmatrix} = \mathbf{I}.$$

□

(L-12) Problema 7(a) $\hat{\mathbf{b}}_1 = \mathbf{A}_1(\mathbf{A}_1^\top \mathbf{A}_1)^{-1}(\mathbf{A}_1^\top) \mathbf{b}_1 = (2, 3, 0)$ y $[\hat{1}]e = (0, 0, 4)$.

□

(L-12) Problema 7(b) $\hat{\mathbf{b}}_2 = \mathbf{A}_2(\mathbf{A}_2^\top \mathbf{A}_2)^{-1}(\mathbf{A}_2^\top) \mathbf{b}_2 = (4, 4, 6)$ y $\hat{\mathbf{e}}_2 = (0, 0, 0)$.

□

(L-12) Problema 7(c)

$$\mathbf{P}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ proyección sobre el plano } xy. \quad \mathbf{P}_2 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = (\mathbf{P}_2)^2.$$

□